

การดูแลป้องกันการติดเชื้อแผลฝีเย็บในมารดาคลอด งานห้องคลอด รพ. โพนนาแก้ว

นางสาวสุวิจิ จาเพียรราช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 091-7791064

อีเมลล์ : yingsu4809228@gmail.com

ที่มาของปัญหา: จากอุบัติการณ์การคลอดที่โรงพยาบาลโพนนาแก้ว ปี 2561 พบแผลฝีเย็บติดเชื้อ 1 ราย (7.69%) จากการวิเคราะห์สาเหตุพบว่า 1. เกิดจากการคลอดยากในระยะที่ 2 การคลอดยาวนานมีการปนเปื้อนอุจจาระขณะคลอด 2. เทคนิคคลอดเชื้อยังไม่ได้มาตรฐาน 3. ความสะอาดของอาคารสถานที่ 4. ระบบการเฝ้าระวังการวินิจฉัยและการรักษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดอัตราการติดเชื้อแผลฝีเย็บของมารดาคลอด

วิธีการดำเนินงาน: 1) ประชุมทบทวนอุบัติการณ์แผลฝีเย็บติดเชื้อร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 2) กำหนดมาตรการป้องกันการติดเชื้อแผลฝีเย็บมารดาคลอดและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อทุกราย 3) บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลติดตามผลการปฏิบัติงาน 4) สรุปผลการปฏิบัติป้องกันการติดเชื้อแผลฝีเย็บของมารดาหลังคลอดทุกเดือน 5) ติดตามประเมินผลภายหลังการนำมาตรการป้องกันการติดเชื้อแผลฝีเย็บใช้กับมารดาคลอดทุกราย 6) ปรับปรุงระบบการเฝ้าระวังภายในห้องคลอดได้แก่ ระบบการสื่อสารส่งต่อในระหว่างเวร, บันทึกความผิดปกติถ้าพบแผลบวมแดงพิจารณาให้ Antibiotic ตามเกณฑ์การให้ Antibiotic , แผลอักเสบมีหนอง เก็บ culture ดำรงไว้ทุกราย, ติดตามแผลฝีเย็บเมื่อจำหน่าย โดยแจ้งเครือข่ายรพ.สต. ที่รับผิดชอบออกเยี่ยมหลังคลอด

ผลการดำเนินงาน : หลังการพัฒนาระบบการดูแลเพื่อป้องกันการติดเชื้อแผลฝีเย็บในมารดาคลอด ตั้งแต่ พย. 2561- 30 กย. 2562 พบไม่มีการติดเชื้อแผลฝีเย็บ ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแผลฝีเย็บ 89%

สรุปผล : การปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อแผลฝีเย็บในมารดาคลอด ทำให้อัตราการติดเชื้อลดลงจาก 7.69% เป็น 0%

ณ.บทเรียนที่ได้รับ : อุตบัติการณ์การติดเชื้อแผลฝีเย็บมารดาคลอด มีปัจจัยหลายด้านที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในการพัฒนาระบบงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ